

## FACTORES DETERMINANTES DE TABAQUISMO EN MUJERES EMBARAZADAS DE TUCUMÁN

**Becaria:** Barrenechea GG, Laboratorio de Salud Pública, Tucumán.  
barrenecheagg@gmail.com

**Dirección:** Alcaraz GP, Laboratorio de Salud Pública, Tucumán.

**Colaboración:** Bastos LS; Gorrini M; Frías S; Lara L.

### RESUMEN

#### Introducción

El tabaquismo es uno de los principales problemas de Salud Pública prevenibles en el mundo. En Argentina existe información con respecto a personas mayores de 18 años, pero no permite conocer qué sucede con otros grupos específicos como el de las embarazadas.

#### Objetivos

Describir epidemiológicamente a las mujeres embarazadas y estimar la prevalencia de tabaquismo y sus factores determinantes en mujeres embarazadas de Tucumán en 2015.

#### Métodos

La población objetivo fueron las mujeres embarazadas que concurren a las instituciones seleccionadas. Las participantes se seleccionaron mediante muestreo de conveniencia. Para el análisis de los datos se utilizaron las funciones "glmer" de la biblioteca "lme4" del software R. Se realizaron análisis bivariados utilizando el test de chi cuadrado o de Fisher, según correspondiera. Mediante regresión logística se determinó cuáles eran las variables que presentaban asociación y debían ser tenidas en cuenta a la hora de formular el modelo multinivel.

#### Resultados

La prevalencia de vida de tabaquismo entre las mujeres encuestadas fue del 41,5%, y la mediana de edad de inicio fue de 15 años [RI: 14-17 años]. El 25,3% de las mujeres fumaban al momento de enterarse que estaban embarazadas. La mediana de consumo de estas mujeres fue de 4 cigarrillos por día [RI: 2-10] (mín: 1, máx: 30). El 86,2% de las mujeres que fumaban al momento de enterarse que estaban embarazadas abandonaron el tabaquismo en algún momento del embarazo.

#### Conclusiones

Existe una alta prevalencia de tabaquismo en mujeres al momento de quedar embarazadas. La prevalencia de mujeres fumadoras en edad fértil en Tucumán viene disminuyendo en los últimos años. En este estudio se encontró una prevalencia de mujeres embarazadas del 25%. Se demostró la necesidad de este tipo de estudios, que reportan valores de prevalencia y sus factores determinantes en grupos poblacionales específicos que aportan información.

#### Palabras clave

*Tabaquismo; Mujer Embarazada; Análisis Multinivel; Mujeres; Enfermedades Crónicas*